

Connecting the dots: regional assessment of landscape connectivity in amphibian communities in Central Spain

Carlos Caballero-Díaz^{1,2,3,*}, Pedro Tarroso^{4,5}, Gregorio Sánchez-Montes³, Ismael Reyes-Moya³, Nuria Polo-Cavia¹ & Íñigo Martínez-Solano³

¹ Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, C/ Darwin, 2, 28049 Madrid, Spain

² Asociación Herpetológica Española (AHE). Apdo. Correos 191. 28911 Leganés, Madrid, Spain

³ Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), C/ José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid, Spain

⁴ CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, InBIO Laboratório Associado, Universidade do Porto, Campus de Vairão, 4485-661 Vairão, Portugal


⁵ BIOPOLIS Program in Genomics, Biodiversity and Land Planning, CIBIO, Campus de Vairão, 4485-661 Vairão, Portugal

*Corresponding author: Carlos Caballero-Díaz, carlos.caballero@uam.es, +34 91 497 6775


Landscape Ecology

Online Resource 5. Histograms showing the frequency distribution of habitat suitability scores across pixels for the sixteen native amphibian species in the Community of Madrid. Values close to 0: poor habitat conductance. Values close to 1: good habitat conductance.


Pleurodeles waltl




Salamandra salamandra




Triturus marmoratus




Triturus pygmaeus




Lissotriton boscai




Alytes cisternasii




Alytes obstetricans




Discoglossus galganoi




Pelobates cultripes




Pelodytes punctatus




Bufo spinosus




Epidalea calamita




Hyla molleri



Hyla meridionalis



Rana iberica



Pelophylax perezi

