

<i>Clostridium</i> sp.	F ^a	Restriction Enzyme (Bfal) digestion fragments (nucleotides, nts)																	
<i>C. pasteurianum</i>	8/13	■	154	■	378	■	29	■	146	■	160	■	162	■	68	■	126	■	
<i>C. colicanis</i>	9/9	■	65	■	378	■	29	■	146	■	157	■	163	■	68	■	126	■	
<i>C. chauvoei</i>	6/8			■	378	■	29	■	146	■	101	■	59	■	163	■	68	■	
<i>C. botulinum</i>	9/128			■	378	■	29	■	147	■	158	■	232			■	126	■	
<i>C. novyi</i>	15/17			■	378	■	29	■	146	■	158	■	231			■	126	■	
<i>C. tetani</i>	7/8			■	378	■	29	■	146	■	158	■	231			■	126	■	
<i>C. acetobutylicum</i>	4/24			■	378	■	29	■	146	■	159	■	161	■	68	■	126	■	
<i>C. beijerinckii</i>	19/23			■	378	■	29	■	146	■	159	■	161	■	68	■	126	■	
<i>C. butyricum</i>	31/32			■	378	■	29	■	146	■	159	■	164	■	68	■	126	■	
<i>C. botulinum</i>	34/128			■	378	■	29	■	146	■	159	■	163	■	68	■	126	■	
<i>C. subterminale</i>	8/8			■	378	■	29	■	146	■	160	■	161	■	68	■	126	■	
<i>C. sardiniense</i>	8/9			■	378	■	29	■	146	■	158	■	163	■	68	■	126	■	
<i>C. perfringens</i>	84/92			■	378	■	29	■	146	■	321			■	194			■	
<i>C. kluyveri</i>	14/14			■	378	■	29	■	146	■	517								■
<i>C. baratii</i>	7/8			■	407				■	82	■	64	■	157	■	163	■	68	■
<i>C. acetobutylicum</i>	16/24							■	146	■	160	■	164	■	68	■	126	■	
<i>C. botulinum</i>	27/128			■	378	■	29	■	146	■	185			■	331			■	
<i>C. sporogenes</i>	9/11			■	378	■	29	■	146	■	185			■	331			■	
<i>C. botulinum</i>	57/128			■	195	■	20	■	163	■	29	■	146	■	185			■	

^aFrequency of organisms showing this R.E. digestion pattern.

Symbol (Filled square) indicates RE site in the 16S rDNA sequences.