bpCR-based subgroup analysis

Subgroup	TCbIP	TCbHP	*P* value	Odds ratio (95%CI)
All patients	18/28 (64.3)	48/84 (57.1)	0.506	1.350 [0.557, 3.273]
Age				
≤35	1/2 (50.0)	5/8 (62.5)	1.000	1.000 [0.027, 13.582]
＞35	17/26 (65.4)	43/76 (56.6)	0.431	1.450 [0.574, 3.661]
HR status				
negative	12/14 (85.7)	30/42 (71.4)	0.476	2.400 [0.466, 12.370]
positive	6/14 (42.9)	18/42 (42.9)	1.000	1.000 [0.295, 3.395]
HER2				
2+ /FISH+	2/6 (33.3)	2/10 (20.0)	1.000	2.000 [0.201, 19.914]
3+	16/22 (72.7)	46/74 (62.2)	0.363	1.623 [0.568, 4.635]
Tumor size (cT)				
T1c	1/1 (100.0)	4/7 (57.1)	1.000	NC
T2	11/19 (57.9)	30/53 (56.6)	0.619	1.054 [0.365, 3.044]
T3	3/4 (75.0)	9/16 (56.3)	0.444	2.333 [0.197, 27.567]
T4	3/4 (75.0)	5/8 (62.5)	1.000	1.800 [0.124, 26.196]
Lymph node status (cN)				
N1	4/6 (66.7)	10/18 (55.6)	1.000	1.600 [0.231, 11.082]
N2-3	14/22 (63.6)	38/66 (57.6)	0.617	0.476 [1.289, 3.493]
ki-67				
≥ 20	4/6 (66.7)	4/6 (66.7)	1.000	1.000 [0.091, 11.028]
＜ 20	14/22 (63.6)	44/78 (56.4)	0.544	1.352 [0.509, 3.593]
Histological grade				
G2	10/17 (58.8)	15/30 (50.0)	1.000	1.615 [0.140, 18.581]
G3	5/7 (71.4)	20/34 (58.8)	0.560	1.429 [0.429, 4.753]
Stage (cTNM)				
II	3/5 (60.0)	9/15 (60.0)	1.000	1.000 [0.127, 7.893]
III	15/23 (65.2)	39/69 (56.5)	0.463	1.442 [0.541, 3.273]