




Figure 1 : Graphical representation of the logistic regression with the factors associated with death , their odds ratios (OR) and confidence intervals (CI) (n=1114)

Table 2: Coordinates of the curve for the choice of cut-off

Cut-off	Sensitivity	1 - Specificity
1	1,000	0.989
2	1,000	0.837
3	0.898	0.777
4	0.755	0.432
5	0.714	0.331
6	0.510	0.109
7	0.163	0.052
8	0.061	0.008
9	0.000	0.003
10	0.000	0.000

NDAR score (New Death Assessment Risk)

Score prédictif de décès dans les urgences chirurgicales abdominales de l'adulte

Ceci est un score de recherche académique et les auteurs n'acceptent aucune responsabilité pour l'utilisation clinique ou le mauvais usage de cet outil.

Âge (années):

Grade ASA:

QSIRS: est Négatif

Fréquence Cardiaque (battements/min):

Fréquence Respiratoire (cycles/min):

Température corporelle(°C):

Pression Artérielle Systolique (mm Hg):

Score de Glasgow:

Nombre de Globules Blancs (/mm³):

☐ Diagnostic d'Occlusion (clinique, imagerie ou per opératoire)

☐ Diagnostic de Péritonite (clinique, imagerie ou per opératoire)

☐ Nécrose Intestinale (imagerie ou per opératoire)

Calculer le risque

Figure 3: Online app for clinical use of the score (<https://drndong.shinyapps.io/NDAR/>)