

Escore de gravidade de intolerância ao Metotrexato – MISS

	Queixas (Pontuação de 1-3 pontos)			
	Sem queixas	Leve	Moderada	Grave
	0	1	2	3
DOR ABDOMINAL				
- Após tomar o MTX, eu tenho dor abdominal	☐	☐	☐	☐
- Eu tenho dor abdominal muitas horas antes ou até um dia antes de tomar o MTX	☐	☐	☐	☐
- Eu tenho dor abdominal só de pensar no MTX	☐	☐	☐	☐
NÁUSEAS				
- Após tomar o MTX, eu tenho náuseas	☐	☐	☐	☐
- Eu tenho náuseas muitas horas antes ou até um dia antes de tomar o MTX	☐	☐	☐	☐
- Eu tenho náuseas só de pensar no MTX	☐	☐	☐	☐
VÔMITOS				
- Após tomar o MTX, eu tenho vômito	☐	☐	☐	☐
- Eu tenho vômito muitas horas antes ou até um dia antes de tomar o MTX	☐	☐	☐	☐
QUEIXAS COMPORTAMENTAIS				
- Eu fico inquieto quando tenho de tomar o MTX	☐	☐	☐	☐
- Eu tenho vontade de chorar quando eu tenho de tomar o MTX	☐	☐	☐	☐
- Eu fico mal-humorado/ irritado quando eu tenho de tomar o MTX	☐	☐	☐	☐
- Eu não tomo o MTX porque eu detesto os efeitos colaterais	☐	☐	☐	☐